

ما الذي أحتاج إلى معرفته بعد كل جرعة من PLUVICTO®؟

1. المساعدة في تقليل التعرض للإشعاع لنفسك وللآخرين

يصدر جسمك ودمك وبولك إشعاعاً لفترة من الوقت بعد تلقي عقار PLUVICTO. لذا، من المهم الالتزام بهذه التعليمات. لكل هذه التعليمات، يُحتسب اليوم 1 على أنه اليوم التالي للحصول على PLUVICTO.

احرص على النوم في غرفة نوم منفصلة

لمدة 3 أيام بعيداً عن البالغين الآخرين

لمدة 7 أيام بعيداً عن الأطفال

لمدة 15 يوماً بعيداً عن النساء الحوامل



حافظ على ترطيب جسمك

لمدة يوم واحد، احرص على شرب

الكثير وتبول قدر الإمكان



ابقَ على بُعد مسافة أكثر من 3 أقدام
من الآخرين

لمدة يومين من البالغين الآخرين

لمدة 7 أيام من الأطفال أو

النساء الحوامل



عدم ممارسة الجنس في البداية، ثم استخدام وسيلة
منع حمل فعالة

لمدة 7 أيام بدون جنس

خلال فترة علاجك ولمدة 14 أسبوعاً بعد جرعتك الأخيرة،

استخدم وسيلة منع حمل فعالة لتجنب الحمل



قد يسبب العلاج العقم

2. انتبه للآثار الجانبية خلال علاجك وبعده

أخبر طبيبك عن أي آثار جانبية تعاني منها حيث قد يكون قادراً على المساعدة.

تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعاً لعقار PLUVICTO ما يلي:

- انخفاض عدد خلايا الدم
- التعب
- جفاف الفم
- الغثيان
- فقدان الشهية
- ألم المفاصل
- الإمساك
- ألم الظهر

3. خطط لموعدك التالي لتحاليل الدم مع طبيبك

سيُتبعين عليك إجراء تحاليل الدم مرة أخرى قبل أسبوع أو أسبوعين من المرة التالية التي تتلقى فيها PLUVICTO.

لمزيد من المعلومات، يُرجى

زيارة PLUVICTO.com

أو اتصل بطبيبك.

معلومات السلامة المهمة

ما عقار PLUVICTO® (لوتيتيوم لو 177 فيبيفوتايد تتراسيتان)؟

إن عقار PLUVICTO هو علاج يُصرف بوصفة طبية يُستخدم لعلاج البالغين المصابين بسرطان البروستاتا النقيلي المقاوم للإخصاء الإيجابي لمستضد غشاء البروستاتا النوعي (PSMA+ mCRPC) والذين تم علاجهم باستخدام:

- العلاج الهرموني ويُعتبر مناسبًا لتأجيل العلاج الكيميائي، أو
- العلاج الهرموني والعلاج الكيميائي

معلومات السلامة المهمة

ما أهم المعلومات التي يجب أن أعرفها عن عقار PLUVICTO؟

ينطوي استخدام عقار PLUVICTO على التعرض للإشعاع. يرتبط التعرض للإشعاع المتراكم على المدى الطويل بزيادة خطر الإصابة بالسرطان. لذا، احرص على شرب الكثير من الماء والتبول قدر الإمكان خلال الساعات الأولى بعد تلقي العقار.

لتقليل تعرض الآخرين للإشعاع بعد تلقي عقار PLUVICTO، يجب الحد من الاتصال الوثيق (أقل من 3 أقدام) مع المخالطين في المنزل لمدة يومين أو مع الأطفال والنساء الحوامل لمدة 7 أيام. يجب الامتناع عن النشاط الجنسي لمدة 7 أيام، والنوم في غرفة نوم منفصلة عن المخالطين في المنزل لمدة 3 أيام، وعن الأطفال لمدة 7 أيام، أو عن النساء الحوامل لمدة 15 يومًا.

قد يسبب عقار PLUVICTO آثارًا جانبية خطيرة، تشمل ما يلي:

انخفاض في عدد خلايا الدم. أخبر طبيبك على الفور إذا ظهرت عليك أي أعراض جديدة أو متفاقمة، تشمل ما يلي:

- التعب أو الضعف
- شحوب البشرة
- ضيق التنفس
- النزيف أو التكدّم بسهولة أكثر من المعتاد أو صعوبة في وقف النزيف
- عدوى متكررة مصحوبة بعلامات مثل الحمى، أو القشعريرة، أو التهاب الحلق، أو قرح الفم

مشكلات في الكلى. يجب أن تحافظ على ترطيب جسمك جيدًا قبل العلاج وبعده. أخبر طبيبك على الفور إذا ظهرت عليك أي أعراض بولية جديدة أو متفاقمة.

جميع الأدوية الإشعاعية، بما في ذلك عقار PLUVICTO، من المحتمل أن تسبب ضررًا للجنين.

- يجب عليك استخدام وسيلة منع حمل فعّالة خلال فترة العلاج بعقار PLUVICTO ولمدة 14 أسبوعًا بعد آخر جرعة
- قد يسبب عقار PLUVICTO عقمًا مؤقتًا أو دائمًا.

تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لعقار PLUVICTO ما يلي:

- انخفاض عدد خلايا الدم
- التعب
- جفاف الفم
- الغثيان
- فقدان الشهية
- ألم المفاصل
- الإمساك
- ألم الظهر

هذه ليست كل الآثار الجانبية المحتملة لعقار PLUVICTO. اتصل بطبيبك للحصول على المشورة بشأن الآثار الجانبية. نشجعك على الإبلاغ عن الآثار الجانبية السلبية للأدوية الموصوفة طبياً إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA). تفضل بزيارة www.fda.gov/medwatch، أو اتصل على الرقم 1-800-FDA-1088.

يُرجى الاطلاع على معلومات الوصفة الطبية الكاملة.