

ما الذي أحتاج إلى معرفته بعد كل جرعة من PLUVICTO®؟

1. ساعد في التقليل من التعرض للإشعاع، سواء بالنسبة لك أو للآخرين. ينبعث من جسمك ودمك وبولك إشعاع لفترة من الوقت بعد الحصول على PLUVICTO. لذلك، من المهم اتباع هذه التعليمات. بالنسبة لجميع هذه التعليمات، يُحتسب اليوم الأول بدءًا من اليوم التالي لتلقيك

احرص على النوم بمفردك في غرفة نوم منفصلة
لمدة 3 أيام بعيدًا عن البالغين الآخرين
لمدة 7 أيام بعيدًا عن الأطفال
لمدة 15 يومًا بعيدًا عن السيدات الحوامل



احرص على شرب كمية كافية من
السوائل
لمدة يوم واحد اشرب الكثير من
المياه وتبول بقدر ما تستطيع



لا تمارس الجنس في البداية، ثم استخدم وسائل
منع حمل فعالة
لمدة 7 أيام لا تمارس الجنس
خلال فترة العلاج ولمدة 14 أسبوعًا بعد آخر جرعة،
استخدم وسائل منع حمل فعالة لتجنب الحمل



ابتعد عن الآخرين بأكثر من 3 أقدام
لمدة يومين ابتعد عن البالغين
الآخرين
لمدة 7 أيام ابتعد عن الأطفال أو
السيدات الحوامل



قد يسبب العلاج العقم

2. ترقب الآثار الجانبية في أثناء العلاج وبعده

الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لـ PLUVICTO هي:

- انخفاض عدد خلايا الدم
- اختلال نتائج الفحوصات المخبرية
- التعب
- جفاف الفم
- الغثيان
- مشكلات الكلى

3. التخطيط لموعدك القادم لفحص الدم مع طبيبك
ستحتاج إلى إجراء فحص الدم مرة أخرى قبل أسبوع إلى أسبوعين اثنين من الجرعة التالية لدواء PLUVICTO.

لمزيد من المعلومات، تفضل
بزيارة PLUVICTO.com
أو تواصل مع طبيبك.

معلومات السلامة الهامة

ما هو PLUVICTO® (لوتيتيوم Lu 177 فيبيفوتيد تيتراكستاتان)؟

PLUVICTO هو علاج يُصرف بوصفة طبية ويُستخدم لعلاج البالغين المصابين بسرطان البروستاتا النقيلي الإيجابي لمستضد غشاء البروستاتا النوعي (PSMA+) والذين:

- لم يتلقوا سابقًا علاجًا معدّلًا لمسار الأندروجين أو لديهم مرض حساس للعلاج المعدّل لمسار الأندروجين (mAPMN/S)، بالاشتراك مع العلاج الهرموني، أو لديهم مقاومة للعلاج المعدّل لمسار الأندروجين (mAPMR) بعد العلاج الهرموني، و
- من المناسب لهم تأخير العلاج الكيميائي، أو
- تلقوا علاجًا كيميائيًا في السابق

معلومات السلامة الهامة

ما أهم المعلومات التي يجب أن أعرفها عن PLUVICTO؟

ينطوي استخدام PLUVICTO على التعرض للنشاط الإشعاعي. يرتبط التعرض للإشعاع المتراكم على المدى الطويل بزيادة خطر الإصابة بالسرطان. اشرب الكثير من الماء وتبول قدر الإمكان خلال الساعات الأولى بعد تناوله.

لتقليل التعرض للإشعاع للآخرين بعد تناول PLUVICTO، قلل من التواصل عن قرب (أقل من 3 أقدام) مع الأشخاص في المنزل لمدة يومين أو مع الأطفال والنساء الحوامل لمدة 7 أيام. امتنع عن ممارسة الجنس لمدة 7 أيام، واحرص على النوم في غرفة نوم منفصلة عن الأشخاص الآخرين في المنزل لمدة 3 أيام، وعن الأطفال لمدة 7 أيام، أو عن النساء الحوامل لمدة 15 يومًا.

قد يسبب PLUVICTO آثارًا جانبية خطيرة، بما في ذلك:

انخفاض مستوى خلايا الدم، والذي قد يكون شديدًا ومهددًا للحياة. أخبر طبيبك على الفور إذا ظهرت عليك أي أعراض جديدة أو متفاقمة، بما في ذلك:

- التعب أو الضعف
- شحوب البشرة
- ضيق التنفس

- النزيف أو التكدس بسهولة أكثر من المعتاد أو صعوبة وقف النزيف

- العدوى المتكررة مع علامات مثل الحمى أو القشعريرة أو التهاب الحلق أو تقرحات الفم

مشكلات في الكلى، والتي قد تكون شديدة. يجب عليك الحرص على شرب كمية كافية من السوائل قبل العلاج وبعده. أخبر طبيبك على الفور إذا ظهرت عليك أي أعراض جديدة أو متفاقمة مرتبطة بجهاز التبول.

جميع المستحضرات الصيدلانية الإشعاعية، بما في ذلك PLUVICTO، قد تسبب ضررًا للجنين.

- يجب عليك استخدام وسائل منع حمل فعالة في أثناء العلاج بـ PLUVICTO ولمدة 14 أسبوعًا بعد آخر جرعة

قد يسبب PLUVICTO العقم المؤقت أو الدائم.

تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لـ PLUVICTO ما يلي:

- انخفاض عدد خلايا الدم
- اختلال نتائج الفحوصات المخبرية
- التعب
- جفاف الفم
- الغثيان
- مشكلات الكلى

هذه ليست كل الآثار الجانبية المحتملة لـ PLUVICTO.

اتصل بطبيبك للحصول على المشورة حول الآثار الجانبية. نشجعك على إبلاغ إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (Food and Drug Administration, FDA) عن الآثار الجانبية السلبية للأدوية الموصوفة. تفضل بزيارة www.fda.gov/medwatch، أو اتصل بالرقم 1-800-FDA-1088.

يرجى الاطلاع على معلومات وصف الدواء الكاملة.