

每次接受 PLUVICTO® 给药后， 我需要了解什么？

1. 帮助减少对您自己和他人的辐射暴露

接受 PLUVICTO 后，您的身体、血液和尿液会在一段时间内释放辐射因此，请务必遵守以下指示。对于以下所有指示，请将接受 PLUVICTO 给药后的次日计为第 1 天。



保持充足的水分

1 日内：大量饮水并尽可能频繁排尿



独自睡在单独的卧室内

3 日内：与其他成人分房睡

7 日内：与儿童分房睡

15 日内：与孕妇分房睡



与他人保持 3 英尺以上的距离

2 日内：与其他成人保持该距离

7 日内：与儿童或孕妇保持该距离



先避免性生活，之后采取有效的避孕措施

7 日内：避免性行为

整个治疗期间以及最后一次给药后的 14 周内：采取有效的避孕措施以避免怀孕

治疗可能导致不孕

2. 治疗期间及治疗后，请留意副作用

请将您出现的任何副作用告知医生，医生可能提供相应帮助。

PLUVICTO 最常见的副作用包括：

- 血细胞计数降低
- 实验室检查异常
- 疲倦
- 口干
- 恶心
- 肾脏问题

3. 与您的医生预约下一次血液检查

您需要在下次接受 PLUVICTO 给药前的 1-2 周再次进行血液检查。

欲了解更多信息，请
访问 [PLUVICTO.com](https://www.pluvicto.com)
或联系您的医生。

请参阅下一页的重要安全信息和完整的处方信息。

 **PLUVICTO®**
lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan
INJECTION FOR INTRAVENOUS USE

重要安全信息

PLUVICTO® (lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan) 是什么？

PLUVICTO 是一种处方治疗，用于治疗患有转移性前列腺特异性膜抗原阳性 (PSMA+) 前列腺癌的成人患者，且：

- 雄激素通路调节初治或敏感型 (mAPMN/S) 患者联合激素治疗，或
- 激素治疗后雄激素通路调节抵抗型 (mAPMR)，且
 - 适合延迟化疗，或
 - 既往接受过化疗

重要安全信息

关于 PLUVICTO，我应该了解的最重要信息是什么？

使用 PLUVICTO 涉及放射性暴露。长期累积性辐射暴露与癌症风险增加相关。给药后的最初几小时内，应大量饮水并尽可能频繁排尿。

为尽量减少 PLUVICTO 给药后对他人的辐射暴露，应限制与家庭成员的密切接触（距离小于 3 英尺）2 天，或与儿童和孕妇的密切接触 7 天。7 天内避免性行为；3 天内与家庭成员分房就寝；7 天内与儿童分房就寝；15 天内与孕妇分房就寝。

PLUVICTO 可能引起严重副作用，包括：

血细胞计数偏低：可能程度严重甚至危及生命。如果出现任何新发或加重的症状，包括以下情况，请立即告知您的医生：

- 疲倦或乏力
- 皮肤苍白
- 气短

- 较平时更易出血或瘀伤，或止血困难
- 频繁感染，伴有发热、寒战、咽痛或口腔溃疡等症状

肾脏问题，可能为重度。治疗前后，您应保持充分水合。如果出现任何新发或加重的泌尿系统症状，请立即告知您的医生。

包括 PLUVICTO 在内的所有放射性药物均可能对胎儿造成伤害。

- 在 PLUVICTO 治疗期间以及最后一次给药后的 14 周内，您应采取有效的避孕措施

PLUVICTO 可能导致暂时性或永久性不孕。

PLUVICTO 最常见的副作用包括：

- 血细胞计数降低
- 实验室检查异常
- 疲倦
- 口干
- 恶心
- 肾脏问题

以上并非 PLUVICTO 全部可能的副作用。有关副作用的问题，请致电您的医生寻求建议。我们鼓励您向美国食品药品监督管理局 (FDA) 报告处方药的不良反应。请访问 www.fda.gov/medwatch，或致电 1-800-FDA-1088。

请参阅完整的处方信息。