

您是刚确诊转移性前列腺癌 (mPC) 吗？

请继续阅读，了解不同类型的 mPC，
以及一种非化疗类的治疗选择。



现在，FDA 已批准将该疗法用于
转移性前列腺癌确诊的早期阶段

画面为患者形象演绎。

 **PLUVICTO[®]**
lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan
INJECTION FOR INTRAVENOUS USE

FDA, 即美国食品药品监督管理局。

PLUVICTO[®] (镥 177 维帕肽四醋酸盐) 是什么？

PLUVICTO 是一种处方治疗药物，用于治疗转移性前列腺特异性膜抗原阳性 (PSMA 阳性) 前列腺癌成年患者，且患者满足以下任一条件：

- 联合激素治疗时，雄激素通路调节初治型或敏感型 (mAPMN/S) 患者，
- 经激素治疗后，雄激素通路调节抵抗型 (mAPMR) 患者，且
 - 临床适合暂缓化疗，或
 - 已经接受过前期化疗

重要安全信息

关于 PLUVICTO，我应该知道的最重要信息是什么？


使用 PLUVICTO 时会暴露于放射性物质。长期累积的辐射暴露与癌症风险增加相关。给药后的最初几小时内，请大量饮水、尽可能频繁排尿。

请参阅全文中的其他重要安全信息。

如果确诊了 mPC, 充分了解自身病情至关重要

确诊 mPC 可能会带来很大的心理压力, 但学习疾病相关知识、积极参与治疗方案制定, 能帮您更从容地做出治疗决策。

mPC 可以通过激素治疗阻断睾酮的作用——睾酮是推动肿瘤生长和扩散的关键激素。



前列腺癌起源于前列腺部位 (图示 **a** 处)。

进入转移性前列腺癌阶段后, 癌细胞已经扩散到身体的其他部位, 如:

- 骨骼 (图示 **b** 处)
- 局部淋巴结 (图示 **c** 处) 或远处淋巴结 (图示 **d** 处)
- 其他器官 (图示 **e** 处)

重要安全信息 (续)

关于 PLUVICTO, 您需要了解的最重要安全信息 (续)

PLUVICTO 给药后为尽可能降低对他人的辐射暴露, 需遵守以下防护要求: 2 天内不与家人的近距离 (小于 3 英尺 (90 厘米)) 接触, 或 7 天内不与与儿童、孕妇的近距离接触。7 天内避免性生活, 3 天内与家人分房就寝, 7 天内与儿童房就寝, 15 天内与孕妇房就寝。

请参阅全文中的其他重要安全信息。



有不同类型的转移性前列腺癌 (mPC)



转移性激素敏感前列腺癌 (mHSPC):

mPC 对激素治疗有应答。

mHSPC 也被称为 mAPMN/S 前列腺癌。



mHSPC 随时间逐渐进展



转移性去势抵抗性前列腺癌 (mCRPC):

这一类 mPC, 已经对降低睾酮水平的激素治疗失去应答。

mCRPC 也被称为转移性雄激素通路调节耐药型前列腺癌 (mAPMR)。



画面为患者形象演绎。

约 50% 的 mHSPC 男性患者, 会在 2 年内失去对激素治疗*的应答, 进展为 mCRPC。

主动参与治疗方案制定, 和医生沟通 PLUVICTO 这款药物。

*上述患者已对降低睾酮水平的激素治疗失去应答。激素治疗仍可在部分阶段延缓肿瘤生长、降低前列腺特异性抗原 (PSA) 水平。

mAPMN/S 前列腺癌: 转移性雄激素通路调节初治或敏感型前列腺癌; mAPMR 前列腺癌: 转移性雄激素通路调节抵抗型前列腺癌。

重要安全信息 (续)

PLUVICTO 可能会引起严重的副作用, 包括:

血细胞计数降低, 可能会很严重, 甚至危及生命。 如果您出现任何包括以下情况在内的新症状或恶化症状, 请立即告知您的医生:

- 疲惫或乏力
- 皮肤苍白
- 呼吸短促
- 比平时更容易出血或出现瘀斑, 或出血后难以止住
- 频繁发生感染, 伴随发热、寒战、咽痛、口腔溃疡等体征

请参阅全文中的其他重要安全信息。

**PLUVICTO[®]**
lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan
INJECTION FOR INTRAVENOUS USE

PLUVICTO 不是化疗，作用机制完全不同。

PLUVICTO 可用于与您情况相似的男性患者。



靶向治疗药物，

目标是把放射性物质直接递送到 PSMA 阳性癌细胞内部，从内部摧毁肿瘤细胞。它也可能对周边少量健康细胞产生影响



给药方案为每 6 周一次，最多 6 个周期*

有时它还可以和其他 mPC 的治疗方案联合使用。



3 万多名
男性患者

已经在 3 项大型临床研究中完成验证

目前全球已有超过 3 万名男性患者接受过治疗

[点击此处](#)了解更多 PLUVICTO 相关信息，确认它是否适合您。

*根据疾病进展情况、不可耐受的副作用，后续可能会调整剂量或停药。

PSMA+，即前列腺特异性膜抗原阳性。

重要安全信息 (续)

PLUVICTO 可能引发的严重不良反应还包括 (续)：

肾脏损害，部分可能较为严重。治疗前后都需要保持充分补水，降低肾脏受辐射损伤的风险如果出现新发或加重的排尿不适症状，要第一时间告知主治医生。

所有放射性药物 (包括 PLUVICTO) 都可能对**未出生的胎儿造成伤害**。

- PLUVICTO 用药全程以及最后一次给药后的 14 周内，必须采取高效避孕措施

PLUVICTO 可能导致暂时性或永久性的**男性不育**。

请参阅全文中的其他重要安全信息。



想了解 PLUVICTO 是否适合您,首先要和医生确认您的 PSMA 表达状态


PSMA (前列腺特异性膜抗原) 正常存在于前列腺细胞上,但其在前列腺癌细胞上的表达水平最高可达正常细胞的 1000 倍。如果您的 PSMA 表达水平远高于标准阈值,就属于 PSMA 阳性 (PSMA+)。

超过 80% 的前列腺癌患者都属于 PSMA 阳性,您大概率也是。

PSMA 不同于 PSA

PSA
表达水平↑

PSA (前列腺特异性抗原),是前列腺分泌的蛋白,数值通过抽血化验测得。PSA 表达水平升高提示您和您的医生,你体内可能存在肿瘤病灶。



与之相对,PSMA 可通过 PSMA-PET 显像检出。这项检查可以明确肿瘤在体内的转移扩散位置,同时确认您的 PSMA 表达状态是否为 PSMA 阳性 (PSMA+)。

接下来的关键一步是完成 PSMA-PET 显像,
请和您的医生沟通安排这项检查。

PET,即正电子发射断层显像。

重要安全信息 (续)

PLUVICTO 最常见的副作用包括:

- 血细胞计数降低
- 实验室检查异常
- 疲倦
- 口干
- 恶心
- 肾脏问题

请参见全文更多重要安全信息。

 **PLUVICTO[®]**
lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan
INJECTION FOR INTRAVENOUS USE

PLUVICTO

可能是适合您的下
一步诊疗选择



请向您的主治医生
咨询您的 PSMA
表达状态



画面为患者形象演绎。

重要安全信息 (续)

PLUVICTO 最常见的副作用包括 (续)：

以上并非 PLUVICTO 可能产生的所有副作用。请致电您的医生获取有关副作用的建议。我们鼓励您向美国食品药品监督管理局 (FDA) 报告处方药的负面副作用。请访问 www.fda.gov/medwatch, 或致电 1-800-FDA-1088。

请参阅全文中的其他重要安全信息。
请参阅[处方信息全文](#)。

 NOVARTIS

Novartis Pharmaceuticals Corporation
East Hanover, New Jersey 07936-1080

© 2026 Novartis

 **PLUVICTO**[®]
lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan
INJECTION FOR INTRAVENOUS USE

9/26

FA-11740030