

HABLE CON SU MÉDICO SOBRE CÓMO ABORDAR EL COLESTEROL MALO

Es importante llevar un control de sus niveles de colesterol malo (LDL-C).
Esta guía puede ayudarle a tener una conversación abierta y honesta con su médico
sobre el siguiente paso para reducir el colesterol malo.

APROVECHE AL MÁXIMO LAS CONVERSACIONES CON SU MÉDICO

Responda estas preguntas breves y compártalas con su médico
para que puedan decidir en conjunto cuál es el mejor camino a seguir.

1 Para las personas con un diagnóstico conocido de enfermedad cardíaca, los niveles recomendados de colesterol (LDL-C) son de menos de 70 mg/dl.

¿Sabe qué nivel tiene? _____ mg/dl

2 En una escala del 1 al 10 (1 = nada de preocupación, 10 = mucha preocupación), ¿cómo describiría su grado de preocupación por su colesterol malo?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 ¿Cuáles son las 3 razones principales por las que quiere reducir su nivel de LDL-C?

- Me preocupa tener un ataque al corazón, un accidente cerebrovascular u otros problemas de salud graves*
- Trato de preocuparme por mi salud lo más posible
- Lo hago por mi familia (cónyuge, hijos, nietos), que cuentan conmigo para que esté presente para ellos
- Mi médico lo recomienda
- Otra opción _____

*No se sabe si LEQVIO puede disminuir los problemas relacionados con los niveles altos de colesterol, como ataque al corazón o accidente cerebrovascular.

4 ¿Qué dificultades ha tenido para hacer cambios en su estilo de vida, de haberlas?

- Recordar tomar mi medicamento en el horario indicado
- Mejorar mi alimentación y aumentar la cantidad de actividad física
- Limitar los hábitos no saludables, como fumar y tomar bebidas alcohólicas en exceso
- Lidiar con otros problemas de salud, como diabetes o hipertensión
- Preocuparme por el pago de mis medicamentos
- Otra opción _____

5 ¿Considera que sabe qué más puede hacer para reducir su colesterol malo?

- Sí, sé qué cambios adicionales puedo hacer
- No, necesito ayuda para entender mejor qué más puedo hacer
- No sé con certeza si necesito hacer más cambios

¿Qué es LEQVIO?

LEQVIO (inclisiran) es un medicamento inyectable de venta con receta que se utiliza en combinación con dieta y ejercicio para reducir el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL-C) o colesterol "malo" en adultos con niveles altos de colesterol en la sangre, lo que se conoce como hipercolesterolemia (incluido un tipo de colesterol alto llamado hipercolesterolemia familiar heterocigótica [HeFH]).

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

No use LEQVIO si ha tenido una reacción alérgica al medicamento o a cualquiera de sus ingredientes.

Pueden producirse reacciones alérgicas graves. Busque ayuda médica de inmediato si tiene dificultad para respirar o tragar; hinchazón de la cara, los labios, la lengua o la garganta; mareos y sensación de desmayo; disminución de la presión arterial; picazón intensa en la piel con erupción cutánea roja o protuberancias elevadas.

Consulte toda la Información de Seguridad Importante adicional.

Consulte la [Información de Prescripción](#) completa de LEQVIO.

Para adultos que, en combinación con la dieta y el ejercicio, necesitan ayuda para reducir el colesterol malo (LDL-C)

CONOZCA LEQVIO® Y LA POSIBILIDAD DE REDUCIR EL COLESTEROL MALO

2 dosis al año después de 2 dosis iniciales administradas por su médico.
Está comprobado que reduce el colesterol malo en un 50%*.



SE INTEGRA EN LAS VISITAS SEMESTRALES AL MÉDICO

LEQVIO es una inyección que le administra su médico o proveedor de atención médica, por lo que no es necesario autoinyectarse.



EFFECTOS SECUNDARIOS MÁS FRECUENTES

El efecto secundario más frecuente fue la reacción en el lugar de la inyección, que se observó en el 8% de los adultos que usaron LEQVIO, en comparación con el 2% de los pacientes adultos que recibieron placebo. La reacción en el lugar de la inyección se manifestó como dolor, enrojecimiento y erupción cutánea. Otros efectos secundarios fueron dolor articular y resfriado de pecho.

Los efectos secundarios que llevaron a suspender el tratamiento ocurrieron en el 2.5% de los adultos que tomaban LEQVIO, en comparación con el 1.9% de quienes tomaban placebo (una sustancia que no contiene ningún medicamento).



LEQVIO FUNCIONA JUNTO CON LA DIETA Y EL EJERCICIO Y PODRÍA AYUDARLE A ALCANZAR SUS OBJETIVOS

¿Cuáles de estas opciones le interesan?

- 2 dosis al año después de 2 dosis iniciales
- Está comprobado que reduce el colesterol en un 50% y lo mantiene bajo*
- Una inyección administrada por su médico o proveedor de atención médica
- Todo lo anterior



Usted podría pagar tan solo \$0*

Vaya a [LEQVIO.com/savings-and-support](https://www.leqvio.com/savings-and-support) para obtener más información sobre la asequibilidad de LEQVIO, incluso para pacientes con la Parte B de Medicare y seguro complementario, o para aquellos con seguro comercial o privado.



Obtenga ayuda del Programa de Cuidado de LEQVIO

Cuando le receten LEQVIO, podrá tener acceso a un especialista de cuidado dedicado que le ofrece apoyo personalizado, recordatorios sobre su medicamento, consejos para una vida saludable y más.



Visite <https://www.leqvio.com/signup> o escanee este código QR para obtener más información.

*Con LEQVIO, los adultos en estudios clínicos que tomaban una estatina máxima tolerada redujeron sus niveles de colesterol en un 50% y los mantuvieron bajos durante cada intervalo de dosificación de 6 meses, en comparación con aquellos que tomaban placebo (una sustancia que no contiene ningún medicamento). Los resultados individuales pueden variar.

*Se aplican limitaciones. El Programa de copagos de LEQVIO puede incluir la tarjeta de copago, la tarjeta de pago (si corresponde) y el reembolso. Se aplican montos máximos por tratamiento y un límite anual de beneficios. Oferta no válida en virtud de Medicare, Medicaid, TRICARE, el Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA), el Departamento de Defensa (DoD) o cualquier otro programa federal o estatal. Novartis se reserva el derecho de rescindir, revocar o modificar este Programa sin aviso. Consulte los [Términos y condiciones](#) completos.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONT.)

Los efectos secundarios más frecuentes de LEQVIO fueron: reacción en el lugar de la inyección (incluso dolor, enrojecimiento y erupción cutánea), dolor articular y resfriado de pecho.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de LEQVIO. Consulte a su proveedor de atención médica sobre los efectos secundarios. Se le recomienda informar los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Indicación en la página 1 y la Información de Seguridad Importante adicional a lo largo del material.

Consulte la [Información de Prescripción](#) completa de LEQVIO.

Con licencia de Alnylam Pharmaceuticals, Inc.



Novartis Pharmaceuticals Corporation
East Hanover, New Jersey 07936-1080

