

¿Qué necesito saber DESPUES DE CADA DOSIS DE PLUVICTO®?

1. Ayude a reducir la exposición a la radiación para usted y los demás

Tras recibir PLUVICTO, su cuerpo, sangre y orina emitirán radiación por un tiempo. Por eso, es importante que siga estas instrucciones. Para todas estas instrucciones, cuente como Día 1 el día después de la administración de PLUVICTO.



Manténgase hidratado

Durante 1 día, beba abundante cantidad de líquido y orine con la mayor frecuencia posible



Duerma solo en una habitación separada

Durante 3 días, lejos de otros **adultos**

Durante 7 días, lejos de **niños**

Durante 15 días, lejos de **mujeres embarazadas**



Manténgase a más de 3 pies de distancia de otras personas

Durante 2 días, de otros **adultos**

Durante 7 días, de **niños** o **mujeres embarazadas**



En un principio, absténgase de la actividad sexual, y luego utilice un método anticonceptivo eficaz

Durante 7 días, absténgase de la actividad sexual

Durante el tratamiento y por 14 semanas después de la última dosis, utilice un método anticonceptivo eficaz para evitar embarazos

El tratamiento puede causar infertilidad

2. Preste atención a los efectos secundarios durante y después del tratamiento

Informe a su médico sobre cualquier efecto secundario que tenga, ya que su médico podría ayudarle.

Los efectos secundarios más frecuentes de PLUVICTO incluyen los siguientes:

- Disminución de recuentos de células sanguíneas
- Alteraciones en los resultados de laboratorio
- Cansancio
- Boca seca
- Náuseas
- Problemas renales

3. Planifique con su médico la próxima cita para hacerse análisis de sangre

Tendrá que volver a hacerse análisis de sangre entre 1 y 2 semanas antes de la próxima administración de PLUVICTO.

Para obtener más información,
visite el sitio web PLUVICTO.com
o comuníquese con su médico.

Consulte la Información de Seguridad Importante en la página siguiente y la Información de Prescripción completa.

 **PLUVICTO®**
lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan
INJECTION FOR INTRAVENOUS USE

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Qué es PLUVICTO® (lutetium Lu 177 vipivotide tetraxetan)?

PLUVICTO es un tratamiento recetado que se utiliza para tratar a adultos con cáncer de próstata metastásico positivo para el antígeno prostático específico de la membrana (PSMA+) y que:

- no recibieron previamente o son sensibles a la modulación de la vía androgénica (mAPMN/S) en combinación con terapia hormonal o
- presentan resistencia a la modulación de la vía androgénica (mAPMR) después de la terapia hormonal y
 - son candidatos adecuados para retrasar la quimioterapia o
 - recibieron quimioterapia previamente

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Cuál es la información más importante que debo saber sobre PLUVICTO?

El uso de PLUVICTO implica exposición a la radiactividad. La exposición acumulada a la radiación a largo plazo está asociada con un mayor riesgo de cáncer. Beba abundante agua y orine con la mayor frecuencia posible durante las primeras horas después de la administración.

Para reducir al mínimo la exposición de otras personas a la radiación después de la administración de PLUVICTO, limite el contacto cercano (a menos de 3 pies de distancia) con las personas que viven en su hogar durante 2 días, o con niños y mujeres embarazadas durante 7 días. Absténgase de tener actividad sexual durante 7 días y duerma en una habitación separada de las personas que viven en su hogar durante 3 días, de los niños durante 7 días o de las mujeres embarazadas durante 15 días.

PLUVICTO puede causar efectos secundarios graves, como los siguientes:

Niveles bajos del recuento de células sanguíneas, que podrían ser severos y potencialmente mortales. Informe a su médico de inmediato si presenta síntomas nuevos o síntomas que empeoran, incluidos los siguientes:

- Cansancio o debilidad
- Piel pálida
- Falta de aliento
- Hemorragias o moretones que aparecen más fácilmente que lo habitual o dificultad para detener las hemorragias
- Infecciones frecuentes con signos como fiebre, escalofríos, dolor de garganta o aftas

Problemas renales, que pueden ser severos.

Debe mantenerse bien hidratado antes y después del tratamiento. Informe a su médico de inmediato si presenta síntomas urinarios nuevos o síntomas que empeoran.

Todos los radiofármacos, incluido PLUVICTO, tienen el potencial de **dañar al feto**.

- Debe usar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento con PLUVICTO y por 14 semanas después de la última dosis

PLUVICTO puede causar **infertilidad temporal o permanente**.

Los efectos secundarios más frecuentes de PLUVICTO incluyen los siguientes:

- Disminución de recuentos de células sanguíneas
- Alteraciones en los resultados de laboratorio
- Cansancio
- Boca seca
- Náuseas
- Problemas renales

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de PLUVICTO. Llame a su médico para obtener información sobre los efectos secundarios. Le recomendamos que informe sobre los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Visite www.fda.gov/medwatch o llame al [1-800-FDA-1088](tel:1-800-FDA-1088).

Consulte la Información de Prescripción completa.